



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

1. Болезнь Альцгеймера – до 60%
2. Сосудистая деменция - 15,8%
3. Смешанная деменция - 15%
4. Деменция с тельцами Леви -12%
5. Лобно-височная дегенерация
6. Болезнь Паркинсона
7. Последствия ЧМТ
8. Нейроинфекции
9. Нормотензивная гидроцефалия
10. Опухоли мозга
11. Дисметаболические нарушения
12. Депрессии

} **>90%**
деменций

} **>5%**
**Потенциально
обратимы!!!**

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ПО МКБ-10

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА (БА) или деменция альцгеймеровского типа -
наиболее распространенная форма деменций позднего возраста, которая характеризуется:

- постепенным малозаметным началом в пресенильном или старческом возрасте,
 - неуклонным прогрессированием расстройств памяти и высших корковых функций вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности в целом,
 - характерным комплексом нейropатологических признаков.
-
- Начало болезни: 65-85 лет
 - Продолжительность: от 4 до 15 лет и более
 - Чаще у женщин (может быть связано с большей продолжительностью жизни)



ЭТАПЫ ДЕМЕНЦИИ ПРИ БА

